

慈濟大學 107 學年度
碩博士班、博士學位學程暨碩士在職專班
招生考試命題紙

科目：基礎生物學

共 3 頁

- () 1. 有關狂牛症的致病原變性蛋白 (prion) 之敘述，下列何者錯誤？(A) 主要傳染途徑為食入，再隨患者糞便排出，造成傳染 (B) 感染變性蛋白後往往要經過很長的潛伏期才發病 (C) 變性蛋白不是病毒，不會刺激宿主產生干擾素 (D) 每個人的細胞中均帶有可製造變性蛋白的基因
- () 2. 關於細胞壁下列描述何者正確？(A) 酵母菌的細胞壁是木質素 (B) 香菇的細胞壁是肽聚糖 (C) 藻類的細胞壁是纖維素 (D) 細菌的細胞壁是幾丁質
- () 3. 下列哪一個病毒不是因為跨物種而在人類身上造成感染？(A) 狂犬病病毒 (B) 流感病毒 (C) 伊波拉病毒 (D) 愛滋病毒
- () 4. 關於生物的命名法，下列描述何者錯誤？(A) 主要使用二名法 (B) 第一個字是種名，第二個字是屬名 (C) 第一個字的開頭要大寫，第二個字都小寫 (D) 兩個字都要斜體
- () 5. 關於微生物的描述何者正確？(A) 酵母菌是細菌 (B) 大腸桿菌是原核生物 (C) 病毒不是生物 (D) 噬菌體會感染動物
- () 6. 細菌的何種附加構造可作為接合生殖之用？(A) 鞭毛 (B) 線毛 (C) 內孢子 (D) 外膜
- () 7. 下列何者對溫度的耐受性最高？(A) 原生動物 (B) 酵母菌 (C) 細菌內孢子 (D) B 型肝炎病毒
- () 8. 破傷風的主要症狀為肌肉痙攣，這是由於破傷風菌的何種特性所造成的？(A) 可在傷口快速生長 (B) 可分泌毒素 (C) 可造成宿主的溶血 (D) 具有莢膜
- () 9. 造成梅毒的病原體是一種：(A) 螺旋體 (B) 立克次菌 (C) 披衣菌 (D) 真菌

慈濟大學 107 學年度
碩博士班、博士學位學程暨碩士在職專班
招生考試命題紙

科目：基礎生物學

共 3 頁

- () 10. 有關傳染疾病，下列何者是由細菌感染造成的？(A)口蹄疫 (B)狂犬病 (C)狂牛病 (D)肺結核
- () 11. 下列何者不屬於動物細胞的胞器？(A)葉綠體 (B)粒線體 (C)高基氏體 (D)內質網
- () 12. 關於動物細胞下列何者為非？(A)有核膜 (B)有細胞膜 (C)有細胞壁 (D)粒線體主要功能為產生 ATP
- () 13. 下列何者非免疫系統的細胞？(A)T 淋巴球 (B)肝細胞 (C)自然殺手細胞 (D)嗜中性球
- () 14. 多細胞生物要如何傳遞訊息？(A)利用神經系統 (B)利用內分泌系統 (C)細胞與細胞直接作用 (D)以上皆有可能
- () 15. 關於 B 淋巴球上的抗原接受器(B cell receptor; BCR)，下列何者是對的？(A)一個 B 淋巴球可以同時表現許多不同的抗原接受器 (B)一個抗原接受器通常可與許多不同的抗原作用 (C)抗原接受器就是插在 B 淋巴球細胞膜上的免疫球蛋白分子 (D)只有 IgM 與 IgG 兩種
- () 16. 依照孟德爾遺傳法則,基因型 AaBbCc 之個體,其配子可能產生基因組合的種類有幾種?(A)二種 (B)四種 (C)八種 (D)十六種
- () 17. 使生物體對致病原有保護力的抗體其成分是：(A)RNA (B)DNA (C)蛋白質(D)脂質
- () 18. 狗和貓的細胞中，主要是何種物質不同而造成外觀上的差異？ (A)肝醣 (B)維生素 (C)遺傳物質 DNA (D)脂質
- () 19. 下列有關 DNA 雙股螺旋構造的敘述，何者正確？(A)DNA 上的鹼基對分成嘌呤與嘧

慈濟大學 107 學年度
碩博士班、博士學位學程暨碩士在職專班
招生考試命題紙

科目：基礎生物學

共 3 頁

啖兩大類 (B) A 與 T 以 3 個氫鍵相連 (C) G 與 C 以 2 個氫鍵相連 (D) 兩股以相同的方向形成雙股螺旋構造

- () 20. 粒線體具有自己的 DNA 和核糖體,則下列哪一選項中的兩者關係具有相同的粒線體 DNA? (A)爸爸和媽媽 (B) 外婆和孫子 (C)爺爺和孫女 (D)爸爸和兒子
- () 21. 使你肌膚富有彈性的膠原蛋白質之產生需經過下列何種步驟: (A) RNA → DNA → 膠原蛋白質 (B) DNA → RNA → 膠原蛋白質 (C) RNA → 膠原蛋白質 (D) DNA → 膠原蛋白質
- () 22. 下列何者是常用的消毒牛乳方法? (A) 高壓蒸氣法 (B) 紫外線照射法 (C) 過濾法 (D) 巴斯德滅菌法
- () 23. 通常愛滋病毒比較不會經由下列何種方式感染? (A) 性行為 (B) 共用一套衛浴設備 (C) 輸血 (D) 共用針頭
- () 24. 下列何菌之存在為水被糞便污染的指標? (A) 沙門氏桿菌 (*Salmonella* spp.) (B) 霍亂弧菌 (*Vibrio cholerae*) (C) 大腸桿菌 (*Escherichia coli*) (D) 志賀氏桿菌 (*Shigella* spp.)
- () 25. 細菌代謝碳水化合物所產生的 H_2O_2 對其本身有害, 葡萄球菌會分泌何種酶加以分解? (A) 纖維蛋白溶解酶 (B) 凝固酶 (C) 葡萄球菌激酶 (D) 觸酶